


Euploea sylvester swinhoei

斯氏紫斑蝶

分布於全島低中海拔山區。前翅背面具藍紫色的光澤，腹面為黑褐色，雄蝶前翅近後緣有兩條不明顯的淺色條紋，雌蝶則無。由斯文豪在臺灣採集後，送回英國由華萊士（Alfred Russel Wallace）鑑定命名。

斯氏紫斑蝶
su-sī-tsi-pan-tiap



姓名：


日期：

Oriolus traillii ardens

朱麗鵯

臺灣特有亞種，為第二級珍貴稀有之保育類動物。多棲息於中低海拔山區之森林。雄鳥頭部和翅膀為黑色，其餘部分是明亮之磚紅色；雌鳥羽色大致與雄鳥相似，但胸腹部為白色，且帶有棕黑色條紋。

紅鶯
âng-ing



姓名：

日期：

觀相揣
HIDE & SEEK

走讀臺灣
READ TAIWAN




國立臺灣博物館
National Taiwan Museum

Diploderma swinhonis

斯文豪氏攀蜥

臺灣特有種，分布於臺灣全島、蘭嶼、綠島及小琉球，平地至1500公尺左右地區。喜於森林邊緣的樹幹或地面活動。體背面黃褐色為底，上下唇部白色；雄性頸背部的鬣鱗及體側的亮色縱帶都較雌性明顯。

斯氏杜定
su-sī-tōo-tīng



姓名：


日期：

Ocypode stimpsoni

斯氏沙蟹

臺灣的沙岸地區都可見。成蟹繁殖期時，白天呈橘紅至鮮紅色，驚嚇時轉為暗紅色，再轉成暗褐色、灰褐色，夜間則為黑褐色。因奔跑的速度很快，還能隨時變換行進方向，因此俗稱幽靈蟹、鬼蟹。

斯氏砂馬仔蟹
su-sī-sua-bé-á-hē



姓名：_____

日期：_____

Treron formosae formosae

紅頭綠鳩

臺灣特有亞種，屬二級珍貴稀有的保育類動物。分布於本島東部、南部及綠島、蘭嶼，棲息於低海拔的闊葉林中。頭頂及枕部鋪橙色，翅膀深綠色，雄鳥肩部有明顯紫紅色。而雌鳥無頭頂及肩部的紅色斑。

紅頭青鷓
âng-thâu-tshenn-tsui



姓名：


日期：

Nesiohelix swinhoei

斯文豪氏大蝸牛

臺灣特有種。分布於臺灣北部、中部及花蓮縣太魯閣一帶，中低海拔山區，喜愛潮濕的環境，主要棲息於落葉堆、腐質土，幼體喜棲息在樹上。螺塔很低，圓錐型，殼表有斜線雕刻紋。

斯氏大扁螺
su-sī-tuā-pínn-lê



姓名： _____

日期： _____